



การฉีดวัคซีนของเด็กในประเทศไอซ์แลนด์ ตั้งแต่ กันยายน 2015

อายุ	วัคซีนป้องกันโรค
3 เดือน	คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DTaP) เชื้อหุ้มสมองอักเสบ (Hib) โปลิโอ (Pentavac) นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV)(Synflorix)
5 เดือน	คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DTaP) เชื้อหุ้มสมองอักเสบ (Hib) โปลิโอ (Pentavac) นิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) (Synflorix)
6 เดือน	ไขเชื้อหุ้มสมองอักเสบ MenC (NeisVac-C)
8 เดือน	ไขเชื้อหุ้มสมองอักเสบ MenC (NeisVac-C)
12 เดือน	คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก (DTaP) เชื้อหุ้มสมองอักเสบ (Hib) โปลิโอ (Pentavac) นิวโม คอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV) (Synflorix)
18 เดือน	หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) (M-M-RVAXPRO)
4 ปี	คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก dTaP (Boostrix)
12 ปี	หัด-หัดเยอรมัน-คางทูม (MMR) (M-M-RVAXPRO) แปบปีโลมา มะเร็งปากมดลูก HPV (Cervarix) เฉพาะเด็กผู้หญิง
14 ปี	คอตีบ ไอกรน บาดทะยัก dTaP -โปลิโอ (Boostrix Polio)