Pangkalahatang pagbabakuna para sa mga bata sa Iceland mula Enero 2020

Edad:	Mga Bakuna Laban Sa Sumusunod:
3 buwan	Pertussis (ubong-dalahit), dipterya, tetano, trangkaso na uri B (Hib), at polyo sa isang iniksyon (Pentavac). Pneumococci (pulmonya atbp) sa pangalawang iniksyon (Synflorix).
5 buwan	Pertussis (ubong-dalahit), dipterya, tetano, trangkaso na uri B (Hib), at polyo sa isang iniksyon Pentavac). Pneumococci (pulmonya atbp) sa pangalawang iniksyon (Synflorix).
6 na buwan	Meningococcus C (NeisVac-C).
8 buwan	Meningococcus C (NeisVac-C).
12 buwan	Pertussis (ubong-dalahit), dipterya, tetano, trangkaso na uri B (Hib), at polyo sa isang iniksyon (Pentavac). Pneumococci (pulmonya atbp) sa pangalawang iniksyon (Synflorix). Bulutong sa ikatlong iniksyon (Varilrix).
18 buwan	Tigdas, beke, tigdas-hangin sa isang iniksyon (M-M-RVAXPRO). Bulutong sa pangalawang iniksyon (Varilrix).
4 na taon	Pertussis, dipterya, tetanus (Boostrix) sa isang iniksyon.
12 taon	Tigdas, beke, tigdas-hangin sa isang iniksyon (M-M-RVAXPRO). Cervical cancer (kanser sa liig-liigan) (HPV) para lamang sa mga batang babae. Ang pagitan sa dalawang iniksyon ay hindi bababa sa 6 na buwan (Cervarix).
14 na taon	Pertussis (ubong-dalahit), dipterya, tetano at polio (polyo) sa isang iniksyon (Boostrix Polio).

Ang karagdagang impormasyon tungkol sa mga pagbabakuna ng mga bata ay matatagpuan sa website ng Tanggapan ng Direktor Medikal ng Pangkalusugan (www.landlaeknir.is) at sa mga sentro ng pangkalusugan (health center).