

Neyðarviðbragðssett vegna bóluasetningar

- Adrenalín stl. 1 mg/ml (1:1000) til gjafar í vöðva
Gefðu adrenalín í vöðva utarlega framanvert á læri, 0.01 mg/kg af 1:1,000 (1 mg/ml) lausn, að hámarki 0.5 mg (fullorðinn) skráðu tímasetningu gjafar og skammt og endurtaktu eftir 5-15 mínútur, ef þörf krefur. Flestir sjúklingar svara 1 eða 2skömmtum.
- Klínískar leiðbeiningar um bráðaofnæmiskast (gott að prenta út eintök og hafa með sér á heimili)
- Ávaxtasafi/ þrúgusykur og/eða sykurgel
- Sáraumbúðir og teygjubindi ef fall eða yfirlið
- **Hringið í 112 – sjúkrabíl**

NEYÐARVIÐBRAGÐSSETT („NEYÐARKIT“)

þegar þekking og búnaður er til staðar sbr. leiðbeiningar um ofnæmislost

- Súrefnisgleraugu
- Súrefnismaski með sarp
- Kokrennur í stærðum 5-7
- Öndurnarbelgur og maski
- Æðaleggir (bleikir og grænir)
- Saltvatn til að skola æðalæggi
- Vökvasett til vökvagjafar í æð
- Sáraumbúðir, teygjubindi, hálskragar og SAM-spelka ef fall eða yfirlið
- Ávaxtasafi, þrúgusykur og/eða sykurgel
- Adrenalín stl. 1 mg/ml (1:1000) til gjafar í vöðva eða Jext/Epipen stl. 300 mcg
- Ventolín til innöndunar
- Tabl. Cetrizin
- Aðgangur að súrefni (kútur eða vegg tenging)
- Ringer Acetat innrennslisvökvi

