

Szczepienia przeciw chorobie COVID-19 w różnych sytuacjach



Directorate of Health
Chief Epidemiologist for Iceland

Grupa wiekowa	Szczepionka rekomendowana do szczepień podstawowych	Liczba dawek szczepienia podstawowego	Okres od szczepienia podstawowego do pierwszej dawki przypominającej	Szczepionka rekomendowana do pierwszej dawki przypominającej	Szczepionka rekomendowana do dalszych dawek przypominających	Okres pomiędzy dawkami przypominającymi	Termin szczepienia po zakażeniu COVID-19 zgodnie z poniższym schematem
Osoby w wieku 60 lat i starsze.	Pfizer/Moderna/Astra/Janssen/Nuvaxovid	2	3–4 miesiące	Pfizer/Moderna, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania dostępna w dowolnym momencie	Pfizer/Moderna, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania dostępna w dowolnym momencie	4 miesiące	Po powrocie do zdrowia nie jest zalecane czekanie dłużej niż 3–4 miesiące
Od 55 do 59 lat	Pfizer/Moderna/Astra/Janssen/Nuvaxovid	2	3–4 miesiące	Pfizer/Moderna/Nuvaxovid	Pfizer/Moderna, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania dostępna w dowolnym momencie	4< miesiące – #4 zalecane wyłącznie dla grup ryzyka należących do tej grupy wiekowej (sierpień 2022)	Po powrocie do zdrowia nie jest zalecane czekanie dłużej niż 3–4 miesiące
Od 40 do 54 lat	Mężczyźni biologiczni*: Pfizer/Moderna/Astra/Janssen/Nuvaxovid Inne płcie: Pfizer/Moderna/Janssen/Nuvaxovid W ciąży: Pfizer/Moderna	2	4* miesiące	Pfizer/Moderna/Nuvaxovid	Pfizer/Moderna, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania dostępna w dowolnym momencie	4< miesiące – #4 zalecane wyłącznie dla grup ryzyka należących do tej grupy wiekowej (sierpień 2022)	Po powrocie do zdrowia nie jest zalecane czekanie dłużej niż 3–4 miesiące
Od 18 do 39 lat	Biologiczne kobiety*: Pfizer/Moderna/Janssen/Nuvaxovid Inne płcie: Pfizer/Janssen/Nuvaxovid W ciąży: Pfizer/Moderna	2	4* miesiące	Pfizer/Moderna/Nuvaxovid	Pfizer, najnowsza szczepionka / szczepionka o najszerszym spektrum działania dostępna w dowolnym momencie	4< miesiące – #4 zalecane wyłącznie dla grup ryzyka należących do tej grupy wiekowej (sierpień 2022)	Po powrocie do zdrowia nie jest zalecane czekanie dłużej niż 3–4 miesiące
Od 12 do 17 lat	Pfizer	2	4<* miesiące – #3 zalecane wyłącznie dla grup ryzyka należących do tej grupy wiekowej (sierpień 2022)	Pfizer/Nuvaxovid		4< miesiące – #4 zalecane wyłącznie dla określonych grup ryzyka należących do tej grupy wiekowej (sierpień 2022)	Po powrocie do zdrowia (szczepienie podstawowe #2 lub dawka przypominająca zgodnie z zaleceniami lekarza)
Od 5 do 11 lat	Pfizer 10 µg/dawka	2	4<* miesiące – #3 zalecane wyłącznie dla określonych grup ryzyka należących do tej grupy wiekowej (sierpień 2022)	Pfizer 10 µg/dawka		Dalsze dawki przypominające nie są zalecane (sierpień 2022)	Po powrocie do zdrowia (szczepienie podstawowe #2 lub dawka przypominająca zgodnie z zaleceniami lekarza)
Od 0 do 4 lat	Nie dotyczy	--	--			--	--

‡ Zapis o płci wynika z ograniczeń dotyczących stosowania poszczególnych szczepionek u osób płci innej niż wskazana w danym przedziale wiekowym. * Z powodu silnej immunosupresji czas może zostać skrócony do 3 miesięcy.