

Vacunación contra la COVID-19 en circunstancias diversas



Directorate of Health
Chief Epidemiologist for Iceland

Grupo de edad	Vacuna recomendada para vacunación principal	Número de dosis de vacunación principal	Periodo desde la vacunación principal hasta la primera dosis de refuerzo	Vacuna recomendada para primera dosis de refuerzo	Vacuna recomendada para dosis de refuerzo adicionales	Periodo entre dosis de refuerzo	Momento de vacunación conforme a este plan tras el contagio de COVID-19
60 años y más	Pfizer/Moderna/Astra/Janssen/Nuvaxovid	2	3–4 meses	Pfizer/Moderna, versión más reciente/de espectro más amplio disponible en cada momento	Pfizer/Moderna, versión más reciente/de espectro más amplio disponible en cada momento	4 meses	Tras recuperarse de la enfermedad, se recomienda una espera no superior a 3–4 meses
55–59 años	Pfizer/Moderna/Astra/Janssen/Nuvaxovid	2	3–4 meses	Pfizer/Moderna/Nuvaxovid	Pfizer/Moderna, versión más reciente/de espectro más amplio disponible en cada momento	4 < meses: 4 solo se recomienda para grupos de riesgo en este grupo de edad (agosto de 2022)	Tras recuperarse de la enfermedad, se recomienda una espera no superior a 3–4 meses
40–54 años	Hombres cis [‡] : Pfizer/Moderna/Astra/Janssen/Nuvaxovid Otros géneros: Pfizer/Moderna/Janssen/Nuvaxovid Embarazadas: Pfizer/Moderna	2	4* meses	Pfizer/Moderna/Nuvaxovid	Pfizer/Moderna, versión más reciente/de espectro más amplio disponible en cada momento	4 < meses: 4 solo se recomienda para grupos de riesgo en este grupo de edad (agosto de 2022)	Tras recuperarse de la enfermedad, se recomienda una espera no superior a 3–4 meses
18–39 años	Mujeres cis [‡] : Pfizer/Moderna/Janssen/Nuvaxovid Otros géneros: Pfizer/Janssen/Nuvaxovid Embarazadas: Pfizer/Moderna	2	4* meses	Pfizer/Moderna/Nuvaxovid	Pfizer, versión más reciente/de espectro más amplio disponible en cada momento	4 < meses: 4 solo se recomienda para grupos de riesgo en este grupo de edad (agosto de 2022)	Tras recuperarse de la enfermedad, se recomienda una espera no superior a 3–4 meses
12–17 años	Pfizer	2	4 < * meses: 3 solo se recomienda para grupos de riesgo en este grupo de edad (agosto de 2022)	Pfizer/Nuvaxovid		4 < meses: 4 solo se recomienda para grupos de riesgo especificados en este grupo de edad (agosto de 2022)	Tras recuperarse de la enfermedad (vacunación principal n.º 2 o dosis de refuerzo conforme a las recomendaciones de un médico)
5–11 años	Pfizer 10 mcg/dosis	2	4 < * meses: 3 solo se recomienda para grupos de riesgo especificados en este grupo de edad (agosto de 2022)	Pfizer 10 mcg/dosis		No se recomiendan dosis de refuerzo adicionales (agosto de 2022)	Tras recuperarse de la enfermedad (vacunación principal n.º 2 o dosis de refuerzo conforme a las recomendaciones de un médico)
0–4 años	Ninguna	--	--			--	--

‡ Si se especifica aquí el género, se debe a las restricciones en el uso de determinadas vacunas en personas que no son de ese género en la edad correspondiente. * Puede bajar hasta 3 meses debido a inmunodepresión grave.