

Skiepijimas nuo COVID-19 įvairiomis aplinkybėmis



Directorate of Health
Chief Epidemiologist for Iceland

Amžiaus grupė	Rekomenduojama vakcina pirminei vakcinacijai	Pirminės vakcinacijos dozių skaičius	Laikotarpis nuo pirminės vakcinacijos iki stiprinamosios dozės	Rekomenduojama vakcina pirmajai stiprinamajai dozei	Rekomenduojama vakcina kitoms stiprinamosioms dozėms	Laikotarpis tarp stiprinamųjų dozių	Skiepijimo laikas pagal šią schemą po užsikrėtimo COVID-19 infekcija
60 metų ir vyresni	„Pfizer“ / „Moderna“ / „Astra“ / „Janssen“ / „Nuvaxovid“	2	3–4 mėnesiai	„Pfizer“ / „Moderna“, naujausią / plataus spektro versiją galima gauti bet kada	„Pfizer“ / „Moderna“, naujausią / plataus spektro versiją galima gauti bet kada	4 mėnesiai	Pasveikus po ligos, nerekomenduojama laukti ilgiau negu 3–4 mėnesius
55–59 metai	„Pfizer“ / „Moderna“ / „Astra“ / „Janssen“ / „Nuvaxovid“	2	3–4 mėnesiai	„Pfizer“ / „Moderna“ / „Nuvaxovid“	„Pfizer“ / „Moderna“, naujausią / plataus spektro versiją galima gauti bet kada	Iki 4 mėnesių – 4 dozė rekomenduojama tik šiai amžiaus grupei priklausančioms rizikos grupėms (2022 m. rugpjūtis)	Pasveikus po ligos, nerekomenduojama laukti ilgiau negu 3–4 mėnesius
40–54 metai	Cislyčiai asmenys [‡] : „Pfizer“ / „Moderna“ / „Astra“ / „Janssen“ / „Nuvaxovid“ Kitos lytys: „Pfizer“ / „Moderna“ / „Janssen“ / „Nuvaxovid“ Nėščiosios: „Pfizer“ / „Moderna“	2	4* mėnesiai	„Pfizer“ / „Moderna“ / „Nuvaxovid“	„Pfizer“ / „Moderna“, naujausią / plataus spektro versiją galima gauti bet kada	Iki 4 mėnesių – 4 dozė rekomenduojama tik šiai amžiaus grupei priklausančioms rizikos grupėms (2022 m. rugpjūtis)	Pasveikus po ligos, nerekomenduojama laukti ilgiau negu 3–4 mėnesius
18–39 metai	Cislytės moterys [‡] : „Pfizer“ / „Moderna“ / „Janssen“ / „Nuvaxovid“ Kitos lytys: „Pfizer“ / „Janssen“ / „Nuvaxovid“ Nėščiosios: „Pfizer“ / „Moderna“	2	4* mėnesiai	„Pfizer“ / „Moderna“ / „Nuvaxovid“	„Pfizer“, naujausią / plataus spektro versiją galima gauti bet kada	Iki 4 mėnesių – 4 dozė rekomenduojama tik šiai amžiaus grupei priklausančioms rizikos grupėms (2022 m. rugpjūtis)	Pasveikus po ligos, nerekomenduojama laukti ilgiau negu 3–4 mėnesius
12–17 metų	„Pfizer“	2	Iki 4* mėnesių – 3 dozė rekomenduojama tik šiai amžiaus grupei priklausančioms rizikos grupėms (2022 m. rugpjūtis)	„Pfizer“ / „Nuvaxovid“		Iki 4 mėnesių – 4 dozė rekomenduojama tik šiai amžiaus grupei priklausančioms nurodytoms rizikos grupėms (2022 m. rugpjūtis)	Pasveikus po ligos (pirminės vakcinacijos 2 dozė arba stiprinamoji dozė pagal gydytojo rekomendacijas)
5–11 metų	„Pfizer“ 10 mcg/dozė	2	Iki 4* mėnesių – 3 dozė rekomenduojama tik šiai amžiaus grupei priklausančioms nurodytoms rizikos grupėms (2022 m. rugpjūtis)	„Pfizer“ 10 mcg/dozė		Kitos stiprinamosios dozės nerekomenduojamos (2022 m. rugpjūtis)	Pasveikus po ligos (pirminės vakcinacijos 2 dozė arba stiprinamoji dozė pagal gydytojo rekomendacijas)
0–4 metai	Nėra.	--	--			--	--

‡ Jei lytis nurodyta čia, taip yra dėl ribojimų naudoti tam tikro tipo vakcinas žmonėms, kurie yra kitos negu nurodyta lyties konkrečioje amžiaus grupėje. * Dėl stiprios imunosupresijos gali sutrumpėti iki 3 mėnesių.